

表 692 糖尿病の既往 HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	3	5	8			8
(%)	(37.5)	(62.5)	(100.0)			
20～	110	160	270		18	288
(%)	(40.7)	(59.3)	(100.0)			
30～	456	414	870	2	61	933
(%)	(52.4)	(47.6)	(100.0)			
40～	492	435	927	2	61	990
(%)	(53.1)	(46.9)	(100.0)			
50～	473	285	758	2	79	839
(%)	(62.4)	(37.6)	(100.0)			
60～	301	172	473	1	42	516
(%)	(63.6)	(36.4)	(100.0)			
70～	164	70	234		25	259
(%)	(70.1)	(29.9)	(100.0)			
80～	90	42	132	1	8	141
(%)	(68.2)	(31.8)	(100.0)			
90～	38	18	56		5	61
(%)	(67.9)	(32.1)	(100.0)			
100～	36	18	54		3	57
(%)	(66.7)	(33.3)	(100.0)			
合計	2,163	1,619	3,782	8	302	4,092
(%)	(57.2)	(42.8)	(100.0)			
記載なし	1,510	1,633	3,143	18	1,688	4,849
(%)	(48.0)	(52.0)	(100.0)			
総計	3,673	3,252	6,925	26	1,990	8,941
(%)	(53.0)	(47.0)	(100.0)			
平均	52.46	47.50	50.34	51.25	52.14	50.47
標準偏差	17.91	17.09	17.73	19.10	17.52	17.72

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査