

表 694 糖尿病の既往 収縮期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

収縮期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
60～ (%)	6 (46.2)	7 (53.8)	13 (100.0)			13
80～ (%)	80 (71.4)	32 (28.6)	112 (100.0)	1	11	124
100～ (%)	392 (65.7)	205 (34.3)	597 (100.0)	3	41	641
120～ (%)	885 (62.1)	539 (37.9)	1,424 (100.0)	7	85	1,516
140～ (%)	854 (57.7)	626 (42.3)	1,480 (100.0)	7	92	1,579
160～ (%)	359 (53.5)	312 (46.5)	671 (100.0)	2	48	721
180～ (%)	81 (39.5)	124 (60.5)	205 (100.0)		12	217
200～ (%)	10 (33.3)	20 (66.7)	30 (100.0)		1	31
220～ (%)	3 (33.3)	6 (66.7)	9 (100.0)		1	10
合計 (%)	2,671 (58.8)	1,871 (41.2)	4,542 (100.0)	20	291	4,853
記載なし (%)	1,002 (42.0)	1,381 (58.0)	2,383 (100.0)	6	1,699	4,088
総計 (%)	3,673 (53.0)	3,252 (47.0)	6,925 (100.0)	26	1,990	8,941
平均	138.52	144.59	141.02	137.05	141.10	141.01
標準偏差	21.91	23.79	22.90	18.74	22.88	22.88

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査