

表 695 糖尿病の既往 拡張期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

拡張期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
20～	6	9	15			15
(%)	(40.0)	(60.0)	(100.0)			
40～	189	162	351	2	22	375
(%)	(53.8)	(46.2)	(100.0)			
60～	1,082	868	1,950	8	107	2,065
(%)	(55.5)	(44.5)	(100.0)			
80～	719	483	1,202	4	90	1,296
(%)	(59.8)	(40.2)	(100.0)			
90～	430	234	664	4	46	714
(%)	(64.8)	(35.2)	(100.0)			
100～	219	103	322	1	24	347
(%)	(68.0)	(32.0)	(100.0)			
120～	10	6	16		2	18
(%)	(62.5)	(37.5)	(100.0)			
140～	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	2,657	1,865	4,522	19	291	4,832
(%)	(58.8)	(41.2)	(100.0)			
記載なし	1,016	1,387	2,403	7	1,699	4,109
(%)	(42.3)	(57.7)	(100.0)			
総計	3,673	3,252	6,925	26	1,990	8,941
(%)	(53.0)	(47.0)	(100.0)			
平均	80.08	77.20	78.89	80.11	80.87	79.01
標準偏差	14.52	14.15	14.44	15.92	14.19	14.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査