

表 696 糖尿病の既往 脈拍(拍/分)別 (腹膜透析患者)

| 脈拍   | 既往なし   | 既往あり   | 合計      | 不明    | 記載なし  | 総計    |
|------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|
| 40未満 | 1      | 3      | 4       |       | 1     | 5     |
| (%)  | (25.0) | (75.0) | (100.0) |       |       |       |
| 40～  | 11     | 11     | 22      |       | 3     | 25    |
| (%)  | (50.0) | (50.0) | (100.0) |       |       |       |
| 50～  | 110    | 60     | 170     |       | 17    | 187   |
| (%)  | (64.7) | (35.3) | (100.0) |       |       |       |
| 60～  | 455    | 334    | 789     | 4     | 57    | 850   |
| (%)  | (57.7) | (42.3) | (100.0) |       |       |       |
| 70～  | 675    | 508    | 1,183   | 4     | 84    | 1,271 |
| (%)  | (57.1) | (42.9) | (100.0) |       |       |       |
| 80～  | 556    | 407    | 963     | 4     | 57    | 1,024 |
| (%)  | (57.7) | (42.3) | (100.0) |       |       |       |
| 90～  | 252    | 192    | 444     | 3     | 34    | 481   |
| (%)  | (56.8) | (43.2) | (100.0) |       |       |       |
| 100～ | 109    | 76     | 185     | 4     | 15    | 204   |
| (%)  | (58.9) | (41.1) | (100.0) |       |       |       |
| 110～ | 33     | 14     | 47      |       | 5     | 52    |
| (%)  | (70.2) | (29.8) | (100.0) |       |       |       |
| 120～ | 15     | 4      | 19      |       | 1     | 20    |
| (%)  | (78.9) | (21.1) | (100.0) |       |       |       |
| 合計   | 2,217  | 1,609  | 3,826   | 19    | 274   | 4,119 |
| (%)  | (57.9) | (42.1) | (100.0) |       |       |       |
| 記載なし | 1,456  | 1,643  | 3,099   | 7     | 1,716 | 4,822 |
| (%)  | (47.0) | (53.0) | (100.0) |       |       |       |
| 総計   | 3,673  | 3,252  | 6,925   | 26    | 1,990 | 8,941 |
| (%)  | (53.0) | (47.0) | (100.0) |       |       |       |
| 平均   | 78.18  | 77.97  | 78.09   | 83.63 | 77.65 | 78.09 |
| 標準偏差 | 13.44  | 12.82  | 13.18   | 14.73 | 14.26 | 13.27 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査