

表 698 心筋梗塞の既往 治療方法(新分類)別(透析患者全体)

治療方法 (新分類)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析	175,357	19,933	195,290	771	59,580	255,641
(%)	(89.8)	(10.2)	(100.0)			
Off-line HDF	4,132	749	4,881	15	1,419	6,315
(%)	(84.7)	(15.3)	(100.0)			
On-line HDF	25,124	2,778	27,902	59	8,129	36,090
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
Push/Pull HDF	298	36	334	1	202	537
(%)	(89.2)	(10.8)	(100.0)			
ハイオフィルトレーション	248	54	302		39	341
(%)	(82.1)	(17.9)	(100.0)			
血液濾過	10	5	15		77	92
(%)	(66.7)	(33.3)	(100.0)			
血液吸着透析 (リクセル)	1,214	99	1,313	2	308	1,623
(%)	(92.5)	(7.5)	(100.0)			
血液吸着透析 (その他)	2	3	5		2	7
(%)	(40.0)	(60.0)	(100.0)			
在宅血液透析	343	22	365	3	153	521
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
腹膜透析 (CAPD)	2,873	288	3,161	38	1,822	5,021
(%)	(90.9)	(9.1)	(100.0)			
腹膜透析 (APD)	1,777	161	1,938	16	885	2,839
(%)	(91.7)	(8.3)	(100.0)			
腹膜透析 (CCPD)	710	68	778	12	291	1,081
(%)	(91.3)	(8.7)	(100.0)			
合計	212,088	24,196	236,284	917	72,907	310,108
(%)	(89.8)	(10.2)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	212,088	24,196	236,284	917	72,907	310,108
(%)	(89.8)	(10.2)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
 *腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy
 2014年調査