

表 709 心筋梗塞の既往 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往別（腹膜透析の経験があるか現在施行している患者）

被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
なし	11,037	1,004	12,041	44	104	12,189
(%)	(91.7)	(8.3)	(100.0)			
あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	410	56	466		59	525
(%)	(88.0)	(12.0)	(100.0)			
あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	15		15		1	16
(%)	(100.0)		(100.0)			
あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	56	9	65		3	68
(%)	(86.2)	(13.8)	(100.0)			
あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	59	6	65		2	67
(%)	(90.8)	(9.2)	(100.0)			
合計	11,577	1,075	12,652	44	169	12,865
(%)	(91.5)	(8.5)	(100.0)			
不明	221	29	250	40	14	304
(%)	(88.4)	(11.6)	(100.0)			
記載なし	134	126	260	1	3,700	3,961
(%)	(51.5)	(48.5)	(100.0)			
総計	11,932	1,230	13,162	85	3,883	17,130
(%)	(90.7)	(9.3)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査