

表 712 心筋梗塞の既往 腹膜透析の経験別（透析患者全体）

| 腹膜透析の経験 | 既往なし | 既往あり | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----|--------|---------|
| なし (%) | 182,467 (90.5) | 19,199 (9.5) | 201,666 (100.0) | 781 | 15,364 | 217,811 |
| あり(年末時点 でカテーテル あり) (%) | 5,933 (91.8) | 533 (8.2) | 6,466 (100.0) | 58 | 881 | 7,405 |
| あり(年末時点 でカテーテル なし) (%) | 5,679 (90.2) | 618 (9.8) | 6,297 (100.0) | 17 | 772 | 7,086 |
| 合計 (%) | 194,079 (90.5) | 20,350 (9.5) | 214,429 (100.0) | 856 | 17,017 | 232,302 |
| 不明 (%) | 747 (92.0) | 65 (8.0) | 812 (100.0) | 19 | 68 | 899 |
| 記載なし (%) | 17,262 (82.0) | 3,781 (18.0) | 21,043 (100.0) | 42 | 55,822 | 76,907 |
| 総計 (%) | 212,088 (89.8) | 24,196 (10.2) | 236,284 (100.0) | 917 | 72,907 | 310,108 |

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査