

表 718 心筋梗塞の既往 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（透析患者全体）

透析前アルブミン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	143 (88.3)	19 (11.7)	162 (100.0)	1	22	185
1.5～ (%)	709 (87.1)	105 (12.9)	814 (100.0)	10	165	989
2.0～ (%)	3,010 (88.8)	381 (11.2)	3,391 (100.0)	24	646	4,061
2.5～ (%)	11,281 (88.0)	1,535 (12.0)	12,816 (100.0)	76	2,544	15,436
3.0～ (%)	48,624 (88.7)	6,211 (11.3)	54,835 (100.0)	212	11,061	66,108
3.5～ (%)	101,035 (90.1)	11,123 (9.9)	112,158 (100.0)	329	22,748	135,235
4.0～ (%)	38,032 (91.5)	3,541 (8.5)	41,573 (100.0)	105	8,830	50,508
4.5～ (%)	2,289 (94.1)	144 (5.9)	2,433 (100.0)	9	472	2,914
5.0～ (%)	165 (91.7)	15 (8.3)	180 (100.0)	1	22	203
合計 (%)	205,288 (89.9)	23,074 (10.1)	228,362 (100.0)	767	46,510	275,639
記載なし (%)	6,800 (85.8)	1,122 (14.2)	7,922 (100.0)	150	26,397	34,469
総計 (%)	212,088 (89.8)	24,196 (10.2)	236,284 (100.0)	917	72,907	310,108
平均	3.60	3.55	3.60	3.47	3.60	3.60
標準偏差	0.44	0.44	0.44	0.53	0.44	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査