

表 719 心筋梗塞の既往 透析前CRP濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

透析前CRP濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	102,719 (91.5)	9,554 (8.5)	112,273 (100.0)	378	22,658	135,309
0.2～ (%)	33,142 (88.4)	4,363 (11.6)	37,505 (100.0)	137	7,165	44,807
0.5～ (%)	16,452 (87.2)	2,424 (12.8)	18,876 (100.0)	68	3,813	22,757
1.0～ (%)	10,661 (86.5)	1,661 (13.5)	12,322 (100.0)	57	2,369	14,748
2.0～ (%)	6,531 (86.7)	998 (13.3)	7,529 (100.0)	34	1,442	9,005
4.0～ (%)	2,335 (87.2)	342 (12.8)	2,677 (100.0)	19	548	3,244
6.0～ (%)	1,126 (86.2)	181 (13.8)	1,307 (100.0)	10	259	1,576
8.0～ (%)	608 (85.0)	107 (15.0)	715 (100.0)	4	151	870
10.0～ (%)	754 (85.0)	133 (15.0)	887 (100.0)	5	142	1,034
15.0～ (%)	479 (82.7)	100 (17.3)	579 (100.0)	6	108	693
合計 (%)	174,807 (89.8)	19,863 (10.2)	194,670 (100.0)	718	38,655	234,043
記載なし (%)	37,281 (89.6)	4,333 (10.4)	41,614 (100.0)	199	34,252	76,065
総計 (%)	212,088 (89.8)	24,196 (10.2)	236,284 (100.0)	917	72,907	310,108
平均	0.61	0.85	0.64	0.96	0.61	0.63
標準偏差	1.89	2.44	1.96	2.62	1.72	1.92

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査