

表 720 心筋梗塞の既往 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

透析前補正 カルシウム濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	859 (89.0)	106 (11.0)	965 (100.0)	3	174	1,142
7.0～ (%)	1,241 (91.7)	112 (8.3)	1,353 (100.0)	6	290	1,649
7.5～ (%)	4,711 (90.3)	508 (9.7)	5,219 (100.0)	21	1,159	6,399
8.0～ (%)	15,181 (90.0)	1,683 (10.0)	16,864 (100.0)	54	3,521	20,439
8.4～ (%)	4,420 (90.1)	486 (9.9)	4,906 (100.0)	21	945	5,872
8.5～ (%)	50,010 (89.8)	5,694 (10.2)	55,704 (100.0)	182	11,433	67,319
9.0～ (%)	61,422 (90.1)	6,728 (9.9)	68,150 (100.0)	236	13,618	82,004
9.5～ (%)	40,215 (89.7)	4,602 (10.3)	44,817 (100.0)	126	9,026	53,969
10.0～ (%)	4,953 (89.7)	567 (10.3)	5,520 (100.0)	16	1,062	6,598
10.1～ (%)	12,621 (90.0)	1,409 (10.0)	14,030 (100.0)	49	2,898	16,977
10.5～ (%)	6,093 (89.6)	709 (10.4)	6,802 (100.0)	25	1,443	8,270
11.0～ (%)	2,069 (90.0)	231 (10.0)	2,300 (100.0)	11	470	2,781
11.5～ (%)	710 (87.9)	98 (12.1)	808 (100.0)	4	161	973
12.0～ (%)	496 (86.9)	75 (13.1)	571 (100.0)	3	107	681
合計 (%)	205,001 (89.9)	23,008 (10.1)	228,009 (100.0)	757	46,307	275,073
記載なし (%)	7,087 (85.6)	1,188 (14.4)	8,275 (100.0)	160	26,600	35,035
総計 (%)	212,088 (89.8)	24,196 (10.2)	236,284 (100.0)	917	72,907	310,108
平均	9.19	9.20	9.19	9.19	9.19	9.19
標準偏差	0.74	0.76	0.74	0.77	0.74	0.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査