

表 721 心筋梗塞の既往 透析前リン濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

透析前リン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	7,923 (88.7)	1,013 (11.3)	8,936 (100.0)	43	1,907	10,886
3.0～ (%)	9,908 (88.7)	1,259 (11.3)	11,167 (100.0)	37	2,378	13,582
3.5～ (%)	17,557 (89.2)	2,129 (10.8)	19,686 (100.0)	66	3,930	23,682
4.0～ (%)	26,295 (89.7)	3,028 (10.3)	29,323 (100.0)	94	5,865	35,282
4.5～ (%)	31,354 (89.8)	3,554 (10.2)	34,908 (100.0)	106	7,045	42,059
5.0～ (%)	31,860 (90.2)	3,467 (9.8)	35,327 (100.0)	89	7,302	42,718
5.5～ (%)	27,435 (90.2)	2,986 (9.8)	30,421 (100.0)	91	6,193	36,705
6.0～ (%)	4,679 (90.5)	492 (9.5)	5,171 (100.0)	13	1,077	6,261
6.1～ (%)	15,747 (90.5)	1,656 (9.5)	17,403 (100.0)	58	3,648	21,109
6.5～ (%)	13,644 (90.4)	1,452 (9.6)	15,096 (100.0)	57	3,125	18,278
7.0～ (%)	8,402 (90.4)	891 (9.6)	9,293 (100.0)	39	1,945	11,277
7.5～ (%)	5,101 (90.0)	567 (10.0)	5,668 (100.0)	25	1,165	6,858
8.0～ (%)	3,027 (90.8)	308 (9.2)	3,335 (100.0)	15	703	4,053
8.5～ (%)	1,929 (90.5)	202 (9.5)	2,131 (100.0)	5	436	2,572
9.0～ (%)	3,057 (91.8)	273 (8.2)	3,330 (100.0)	18	729	4,077
合計 (%)	207,918 (89.9)	23,277 (10.1)	231,195 (100.0)	756	47,448	279,399
記載なし (%)	4,170 (81.9)	919 (18.1)	5,089 (100.0)	161	25,459	30,709
総計 (%)	212,088 (89.8)	24,196 (10.2)	236,284 (100.0)	917	72,907	310,108
平均	5.22	5.14	5.21	5.27	5.22	5.21
標準偏差	1.42	1.41	1.42	1.64	1.44	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査