

表 722 心筋梗塞の既往 PTH値(pg/mL)別（透析患者全体）PTH測定法:intact-PTH

| PTH値        | 既往なし              | 既往あり             | 合計                 | 不明     | 記載なし   | 総計      |
|-------------|-------------------|------------------|--------------------|--------|--------|---------|
| 20未満<br>(%) | 9,062<br>(90.9)   | 912<br>(9.1)     | 9,974<br>(100.0)   | 25     | 1,874  | 11,873  |
| 20～<br>(%)  | 12,783<br>(90.0)  | 1,419<br>(10.0)  | 14,202<br>(100.0)  | 36     | 2,708  | 16,946  |
| 40～<br>(%)  | 13,541<br>(90.0)  | 1,506<br>(10.0)  | 15,047<br>(100.0)  | 47     | 2,922  | 18,016  |
| 60～<br>(%)  | 14,549<br>(89.7)  | 1,662<br>(10.3)  | 16,211<br>(100.0)  | 48     | 2,971  | 19,230  |
| 80～<br>(%)  | 14,640<br>(89.2)  | 1,771<br>(10.8)  | 16,411<br>(100.0)  | 51     | 3,151  | 19,613  |
| 100～<br>(%) | 14,305<br>(89.7)  | 1,639<br>(10.3)  | 15,944<br>(100.0)  | 36     | 3,178  | 19,158  |
| 120～<br>(%) | 13,663<br>(90.0)  | 1,526<br>(10.0)  | 15,189<br>(100.0)  | 55     | 2,978  | 18,222  |
| 140～<br>(%) | 12,605<br>(90.2)  | 1,374<br>(9.8)   | 13,979<br>(100.0)  | 48     | 2,780  | 16,807  |
| 160～<br>(%) | 11,341<br>(89.7)  | 1,298<br>(10.3)  | 12,639<br>(100.0)  | 39     | 2,495  | 15,173  |
| 180～<br>(%) | 25,688<br>(89.8)  | 2,925<br>(10.2)  | 28,613<br>(100.0)  | 78     | 5,822  | 34,513  |
| 240～<br>(%) | 341<br>(91.9)     | 30<br>(8.1)      | 371<br>(100.0)     |        | 73     | 444     |
| 241～<br>(%) | 14,763<br>(89.5)  | 1,728<br>(10.5)  | 16,491<br>(100.0)  | 35     | 3,313  | 19,839  |
| 300～<br>(%) | 8,666<br>(90.3)   | 932<br>(9.7)     | 9,598<br>(100.0)   | 28     | 1,900  | 11,526  |
| 360～<br>(%) | 4,978<br>(90.0)   | 556<br>(10.0)    | 5,534<br>(100.0)   | 18     | 1,132  | 6,684   |
| 420～<br>(%) | 2,940<br>(90.9)   | 295<br>(9.1)     | 3,235<br>(100.0)   | 10     | 680    | 3,925   |
| 480～<br>(%) | 745<br>(92.3)     | 62<br>(7.7)      | 807<br>(100.0)     | 5      | 152    | 964     |
| 500～<br>(%) | 1,160<br>(90.6)   | 120<br>(9.4)     | 1,280<br>(100.0)   | 3      | 281    | 1,564   |
| 540～<br>(%) | 1,287<br>(90.9)   | 129<br>(9.1)     | 1,416<br>(100.0)   | 4      | 294    | 1,714   |
| 600～<br>(%) | 2,137<br>(91.4)   | 200<br>(8.6)     | 2,337<br>(100.0)   | 3      | 459    | 2,799   |
| 800～<br>(%) | 1,688<br>(91.6)   | 155<br>(8.4)     | 1,843<br>(100.0)   | 3      | 316    | 2,162   |
| 合計<br>(%)   | 180,882<br>(89.9) | 20,239<br>(10.1) | 201,121<br>(100.0) | 572    | 39,479 | 241,172 |
| 記載なし<br>(%) | 3,709<br>(89.2)   | 450<br>(10.8)    | 4,159<br>(100.0)   | 96     | 2,129  | 6,384   |
| 総計<br>(%)   | 184,591<br>(89.9) | 20,689<br>(10.1) | 205,280<br>(100.0) | 668    | 41,608 | 247,556 |
| 平均          | 172.41            | 167.88           | 171.95             | 163.17 | 173.44 | 172.17  |
| 標準偏差        | 166.01            | 147.23           | 164.23             | 128.53 | 162.95 | 163.94  |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査