

表 725 心筋梗塞の既往 総コレステロール濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

総コレステロール 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	5,564 (85.6)	935 (14.4)	6,499 (100.0)	35	1,296	7,830
100～ (%)	16,198 (86.5)	2,520 (13.5)	18,718 (100.0)	74	3,930	22,722
120～ (%)	30,761 (88.3)	4,071 (11.7)	34,832 (100.0)	126	7,243	42,201
140～ (%)	35,830 (89.5)	4,197 (10.5)	40,027 (100.0)	126	8,506	48,659
160～ (%)	30,332 (91.2)	2,930 (8.8)	33,262 (100.0)	93	6,888	40,243
180～ (%)	19,271 (91.8)	1,711 (8.2)	20,982 (100.0)	58	4,485	25,525
200～ (%)	10,375 (92.5)	844 (7.5)	11,219 (100.0)	41	2,463	13,723
220～ (%)	4,586 (92.9)	350 (7.1)	4,936 (100.0)	13	1,122	6,071
240～ (%)	1,827 (92.7)	143 (7.3)	1,970 (100.0)	1	429	2,400
260～ (%)	1,173 (92.4)	96 (7.6)	1,269 (100.0)	9	308	1,586
合計 (%)	155,917 (89.8)	17,797 (10.2)	173,714 (100.0)	576	36,670	210,960
記載なし (%)	56,171 (89.8)	6,399 (10.2)	62,570 (100.0)	341	36,237	99,148
総計 (%)	212,088 (89.8)	24,196 (10.2)	236,284 (100.0)	917	72,907	310,108
平均	156.52	148.95	155.74	151.87	156.49	155.86
標準偏差	35.67	34.61	35.64	38.14	36.14	35.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査