

表 727 心筋梗塞の既往 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

| Non-HDL-C濃度 | 既往なし              | 既往あり             | 合計                 | 不明     | 記載なし   | 総計      |
|-------------|-------------------|------------------|--------------------|--------|--------|---------|
| 50未満<br>(%) | 2,458<br>(87.9)   | 339<br>(12.1)    | 2,797<br>(100.0)   | 17     | 596    | 3,410   |
| 50～<br>(%)  | 11,581<br>(88.1)  | 1,559<br>(11.9)  | 13,140<br>(100.0)  | 59     | 2,902  | 16,101  |
| 70～<br>(%)  | 25,866<br>(88.7)  | 3,309<br>(11.3)  | 29,175<br>(100.0)  | 106    | 6,288  | 35,569  |
| 90～<br>(%)  | 31,178<br>(89.5)  | 3,643<br>(10.5)  | 34,821<br>(100.0)  | 130    | 7,427  | 42,378  |
| 110～<br>(%) | 25,591<br>(90.5)  | 2,677<br>(9.5)   | 28,268<br>(100.0)  | 88     | 5,847  | 34,203  |
| 130～<br>(%) | 15,728<br>(91.0)  | 1,555<br>(9.0)   | 17,283<br>(100.0)  | 45     | 3,635  | 20,963  |
| 150～<br>(%) | 7,891<br>(91.0)   | 783<br>(9.0)     | 8,674<br>(100.0)   | 35     | 1,881  | 10,590  |
| 170～<br>(%) | 3,571<br>(91.3)   | 341<br>(8.7)     | 3,912<br>(100.0)   | 10     | 800    | 4,722   |
| 190～<br>(%) | 1,364<br>(91.0)   | 135<br>(9.0)     | 1,499<br>(100.0)   | 5      | 305    | 1,809   |
| 210～<br>(%) | 803<br>(90.7)     | 82<br>(9.3)      | 885<br>(100.0)     | 6      | 233    | 1,124   |
| 合計<br>(%)   | 126,031<br>(89.7) | 14,423<br>(10.3) | 140,454<br>(100.0) | 501    | 29,914 | 170,869 |
| 記載なし<br>(%) | 86,057<br>(89.8)  | 9,773<br>(10.2)  | 95,830<br>(100.0)  | 416    | 42,993 | 139,239 |
| 総計<br>(%)   | 212,088<br>(89.8) | 24,196<br>(10.2) | 236,284<br>(100.0) | 917    | 72,907 | 310,108 |
| 平均          | 107.48            | 104.05           | 107.13             | 103.99 | 106.91 | 107.08  |
| 標準偏差        | 33.57             | 33.11            | 33.54              | 36.09  | 33.90  | 33.61   |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査