

表 728 心筋梗塞の既往 透析前収縮期血圧(mmHg)別（透析患者全体）

透析前収縮期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	28 (90.3)	3 (9.7)	31 (100.0)		9	40
60～ (%)	305 (84.3)	57 (15.7)	362 (100.0)		71	433
80～ (%)	2,384 (84.9)	423 (15.1)	2,807 (100.0)	13	518	3,338
100～ (%)	12,847 (87.5)	1,834 (12.5)	14,681 (100.0)	48	2,878	17,607
120～ (%)	39,680 (89.4)	4,720 (10.6)	44,400 (100.0)	161	8,710	53,271
140～ (%)	60,956 (90.3)	6,570 (9.7)	67,526 (100.0)	218	13,078	80,822
160～ (%)	43,787 (90.6)	4,547 (9.4)	48,334 (100.0)	159	9,702	58,195
180～ (%)	16,672 (90.2)	1,805 (9.8)	18,477 (100.0)	66	3,681	22,224
200～ (%)	4,231 (91.5)	394 (8.5)	4,625 (100.0)	14	907	5,546
220～ (%)	875 (90.7)	90 (9.3)	965 (100.0)	4	191	1,160
合計 (%)	181,765 (89.9)	20,443 (10.1)	202,208 (100.0)	683	39,745	242,636
記載なし (%)	30,323 (89.0)	3,753 (11.0)	34,076 (100.0)	234	33,162	67,472
総計 (%)	212,088 (89.8)	24,196 (10.2)	236,284 (100.0)	917	72,907	310,108
平均	151.31	149.04	151.08	150.61	151.36	151.13
標準偏差	24.12	25.00	24.22	24.99	24.24	24.23

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査