

表 747 心筋梗塞の既往 透析後体重(kg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析後体重	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	56	12	68	1	15	84
(%)	(82.4)	(17.6)	(100.0)			
20～	611	46	657	5	140	802
(%)	(93.0)	(7.0)	(100.0)			
30～	14,668	1,233	15,901	66	3,150	19,117
(%)	(92.2)	(7.8)	(100.0)			
40～	45,198	4,521	49,719	190	9,900	59,809
(%)	(90.9)	(9.1)	(100.0)			
50～	53,605	6,371	59,976	190	11,943	72,109
(%)	(89.4)	(10.6)	(100.0)			
60～	32,674	4,127	36,801	129	7,152	44,082
(%)	(88.8)	(11.2)	(100.0)			
70～	12,874	1,499	14,373	48	2,763	17,184
(%)	(89.6)	(10.4)	(100.0)			
80～	4,548	550	5,098	17	966	6,081
(%)	(89.2)	(10.8)	(100.0)			
90～	1,682	155	1,837	4	354	2,195
(%)	(91.6)	(8.4)	(100.0)			
100～	561	63	624	2	129	755
(%)	(89.9)	(10.1)	(100.0)			
110～	230	22	252	1	46	299
(%)	(91.3)	(8.7)	(100.0)			
120～	150	11	161		28	189
(%)	(93.2)	(6.8)	(100.0)			
合計	166,857	18,610	185,467	653	36,586	222,706
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
記載なし	2,290	322	2,612	73	3,580	6,265
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
総計	169,147	18,932	188,079	726	40,166	228,971
(%)	(89.9)	(10.1)	(100.0)			
平均	55.38	56.38	55.48	54.34	55.30	55.45
標準偏差	12.96	12.45	12.91	12.84	12.82	12.90

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査