

表 748 心筋梗塞の既往 体重減少量(kg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満 (%)	558 (91.8)	50 (8.2)	608 (100.0)	3	144	755
0.0～ (%)	6,189 (89.3)	745 (10.7)	6,934 (100.0)	36	1,480	8,450
1.0～ (%)	30,484 (89.7)	3,492 (10.3)	33,976 (100.0)	124	6,925	41,025
2.0～ (%)	54,318 (89.1)	6,669 (10.9)	60,987 (100.0)	178	11,996	73,161
3.0～ (%)	28,429 (89.3)	3,411 (10.7)	31,840 (100.0)	98	6,172	38,110
4.0～ (%)	7,047 (89.6)	814 (10.4)	7,861 (100.0)	15	1,569	9,445
5.0～ (%)	1,484 (90.8)	151 (9.2)	1,635 (100.0)	4	319	1,958
6.0～ (%)	316 (92.4)	26 (7.6)	342 (100.0)	1	52	395
7.0～ (%)	69 (90.8)	7 (9.2)	76 (100.0)		19	95
8.0～ (%)	122 (89.1)	15 (10.9)	137 (100.0)		23	160
合計 (%)	129,016 (89.3)	15,380 (10.7)	144,396 (100.0)	459	28,699	173,554
記載なし (%)	1,633 (85.9)	268 (14.1)	1,901 (100.0)	53	2,701	4,655
総計 (%)	130,649 (89.3)	15,648 (10.7)	146,297 (100.0)	512	31,400	178,209
平均	2.49	2.49	2.49	2.30	2.47	2.49
標準偏差	1.06	1.01	1.05	1.01	1.04	1.05

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査