

表 749 心筋梗塞の既往 体重減少率(%)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少率	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	2,703 (89.2)	328 (10.8)	3,031 (100.0)	21	644	3,696
1.0～ (%)	4,805 (89.0)	596 (11.0)	5,401 (100.0)	19	1,189	6,609
2.0～ (%)	12,367 (88.5)	1,610 (11.5)	13,977 (100.0)	45	2,899	16,921
3.0～ (%)	25,647 (88.9)	3,198 (11.1)	28,845 (100.0)	100	5,639	34,584
4.0～ (%)	34,346 (88.8)	4,332 (11.2)	38,678 (100.0)	120	7,617	46,415
5.0～ (%)	27,189 (89.7)	3,122 (10.3)	30,311 (100.0)	90	5,888	36,289
6.0～ (%)	13,912 (90.6)	1,440 (9.4)	15,352 (100.0)	42	3,033	18,427
7.0～ (%)	5,390 (91.5)	502 (8.5)	5,892 (100.0)	14	1,202	7,108
8.0～ (%)	1,677 (91.6)	153 (8.4)	1,830 (100.0)	5	360	2,195
9.0～ (%)	900 (91.0)	89 (9.0)	989 (100.0)	3	213	1,205
合計 (%)	128,936 (89.3)	15,370 (10.7)	144,306 (100.0)	459	28,684	173,449
記載なし (%)	1,713 (86.0)	278 (14.0)	1,991 (100.0)	53	2,716	4,760
総計 (%)	130,649 (89.3)	15,648 (10.7)	146,297 (100.0)	512	31,400	178,209
平均	4.55	4.44	4.54	4.32	4.51	4.53
標準偏差	1.65	1.59	1.64	1.72	1.67	1.65

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査