

表 752 心筋梗塞の既往 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前クレアチニン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	54 (87.1)	8 (12.9)	62 (100.0)		14	76
2～ (%)	1,168 (85.1)	204 (14.9)	1,372 (100.0)	5	279	1,656
4～ (%)	5,564 (86.2)	888 (13.8)	6,452 (100.0)	28	1,315	7,795
6～ (%)	17,404 (87.0)	2,603 (13.0)	20,007 (100.0)	70	3,929	24,006
8～ (%)	34,092 (88.3)	4,518 (11.7)	38,610 (100.0)	135	7,370	46,115
10～ (%)	35,778 (89.7)	4,124 (10.3)	39,902 (100.0)	122	8,010	48,034
12～ (%)	22,606 (91.3)	2,164 (8.7)	24,770 (100.0)	63	4,921	29,754
14～ (%)	9,323 (92.9)	708 (7.1)	10,031 (100.0)	25	1,980	12,036
16～ (%)	3,202 (94.3)	192 (5.7)	3,394 (100.0)	9	697	4,100
合計 (%)	129,191 (89.3)	15,409 (10.7)	144,600 (100.0)	457	28,515	173,572
記載なし (%)	1,458 (85.9)	239 (14.1)	1,697 (100.0)	55	2,885	4,637
総計 (%)	130,649 (89.3)	15,648 (10.7)	146,297 (100.0)	512	31,400	178,209
平均	10.35	9.79	10.29	9.88	10.31	10.29
標準偏差	2.78	2.72	2.78	2.74	2.81	2.79

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査