

表 755 心筋梗塞の既往 nPCR(g/kg/day)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満	281	36	317	4	48	369
(%)	(88.6)	(11.4)	(100.0)			
0.4～	6,058	935	6,993	28	1,397	8,418
(%)	(86.6)	(13.4)	(100.0)			
0.6～	37,562	5,244	42,806	147	8,003	50,956
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
0.8～	52,921	6,067	58,988	161	11,362	70,511
(%)	(89.7)	(10.3)	(100.0)			
1.0～	21,652	1,958	23,610	72	4,566	28,248
(%)	(91.7)	(8.3)	(100.0)			
1.2～	3,780	312	4,092	18	806	4,916
(%)	(92.4)	(7.6)	(100.0)			
1.4～	430	32	462	1	92	555
(%)	(93.1)	(6.9)	(100.0)			
1.6～	59	6	65		14	79
(%)	(90.8)	(9.2)	(100.0)			
1.8～	18	4	22		3	25
(%)	(81.8)	(18.2)	(100.0)			
2.0～	29	5	34		4	38
(%)	(85.3)	(14.7)	(100.0)			
合計	122,790	14,599	137,389	431	26,295	164,115
(%)	(89.4)	(10.6)	(100.0)			
記載なし	7,859	1,049	8,908	81	5,105	14,094
(%)	(88.2)	(11.8)	(100.0)			
総計	130,649	15,648	146,297	512	31,400	178,209
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
平均	0.86	0.83	0.86	0.85	0.86	0.86
標準偏差	0.18	0.17	0.18	0.19	0.18	0.18

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査