

表 756 心筋梗塞の既往 %クレアチニン産生速度(%)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

%クレアチニン 産生速度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	8,963 (85.7)	1,495 (14.3)	10,458 (100.0)	48	2,044	12,550
60～ (%)	6,544 (85.6)	1,099 (14.4)	7,643 (100.0)	28	1,454	9,125
70～ (%)	10,298 (87.2)	1,510 (12.8)	11,808 (100.0)	35	2,111	13,954
80～ (%)	14,507 (87.6)	2,055 (12.4)	16,562 (100.0)	50	3,071	19,683
90～ (%)	18,574 (88.8)	2,338 (11.2)	20,912 (100.0)	70	3,876	24,858
100～ (%)	20,058 (90.0)	2,219 (10.0)	22,277 (100.0)	66	4,252	26,595
110～ (%)	18,147 (91.1)	1,782 (8.9)	19,929 (100.0)	60	3,865	23,854
120～ (%)	13,318 (92.3)	1,105 (7.7)	14,423 (100.0)	41	2,874	17,338
130～ (%)	7,350 (92.6)	588 (7.4)	7,938 (100.0)	24	1,646	9,608
140～ (%)	4,960 (92.6)	395 (7.4)	5,355 (100.0)	9	1,085	6,449
合計 (%)	122,719 (89.4)	14,586 (10.6)	137,305 (100.0)	431	26,278	164,014
記載なし (%)	7,930 (88.2)	1,062 (11.8)	8,992 (100.0)	81	5,122	14,195
総計 (%)	130,649 (89.3)	15,648 (10.7)	146,297 (100.0)	512	31,400	178,209
平均	99.29	93.33	98.66	95.18	99.22	98.74
標準偏差	25.79	26.18	25.89	27.06	26.27	25.96

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査