

表 757 心筋梗塞の既往 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前アルブミン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	116 (89.2)	14 (10.8)	130 (100.0)	1	15	146
1.5～ (%)	556 (87.8)	77 (12.2)	633 (100.0)	10	128	771
2.0～ (%)	2,382 (89.1)	292 (10.9)	2,674 (100.0)	20	485	3,179
2.5～ (%)	8,995 (88.2)	1,208 (11.8)	10,203 (100.0)	56	1,891	12,150
3.0～ (%)	38,749 (88.8)	4,908 (11.2)	43,657 (100.0)	170	8,255	52,082
3.5～ (%)	80,726 (90.1)	8,871 (9.9)	89,597 (100.0)	268	17,270	107,135
4.0～ (%)	30,734 (91.5)	2,863 (8.5)	33,597 (100.0)	85	6,824	40,506
4.5～ (%)	1,863 (93.9)	122 (6.1)	1,985 (100.0)	5	372	2,362
5.0～ (%)	142 (92.2)	12 (7.8)	154 (100.0)	1	17	172
合計 (%)	164,263 (89.9)	18,367 (10.1)	182,630 (100.0)	616	35,257	218,503
記載なし (%)	4,884 (89.6)	565 (10.4)	5,449 (100.0)	110	4,909	10,468
総計 (%)	169,147 (89.9)	18,932 (10.1)	188,079 (100.0)	726	40,166	228,971
平均	3.60	3.55	3.60	3.46	3.61	3.60
標準偏差	0.44	0.44	0.44	0.53	0.44	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査