

表 758 心筋梗塞の既往 透析前CRP濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前CRP濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	80,835 (91.5)	7,491 (8.5)	88,326 (100.0)	298	16,905	105,529
0.2～ (%)	26,441 (88.5)	3,435 (11.5)	29,876 (100.0)	115	5,387	35,378
0.5～ (%)	13,268 (87.3)	1,925 (12.7)	15,193 (100.0)	54	2,900	18,147
1.0～ (%)	8,622 (86.7)	1,327 (13.3)	9,949 (100.0)	47	1,776	11,772
2.0～ (%)	5,301 (86.9)	801 (13.1)	6,102 (100.0)	28	1,124	7,254
4.0～ (%)	1,879 (87.4)	271 (12.6)	2,150 (100.0)	17	415	2,582
6.0～ (%)	933 (86.6)	144 (13.4)	1,077 (100.0)	8	197	1,282
8.0～ (%)	497 (85.2)	86 (14.8)	583 (100.0)	4	107	694
10.0～ (%)	626 (86.2)	100 (13.8)	726 (100.0)	5	111	842
15.0～ (%)	391 (82.5)	83 (17.5)	474 (100.0)	4	82	560
合計 (%)	138,793 (89.9)	15,663 (10.1)	154,456 (100.0)	580	29,004	184,040
記載なし (%)	30,354 (90.3)	3,269 (9.7)	33,623 (100.0)	146	11,162	44,931
総計 (%)	169,147 (89.9)	18,932 (10.1)	188,079 (100.0)	726	40,166	228,971
平均	0.62	0.86	0.65	0.99	0.61	0.64
標準偏差	1.91	2.49	1.98	2.61	1.73	1.94

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査