

表 759 心筋梗塞の既往 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前補正 カルシウム濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	659 (89.1)	81 (10.9)	740 (100.0)	3	131	874
7.0～ (%)	955 (91.5)	89 (8.5)	1,044 (100.0)	6	216	1,266
7.5～ (%)	3,685 (90.1)	406 (9.9)	4,091 (100.0)	19	861	4,971
8.0～ (%)	12,198 (90.0)	1,349 (10.0)	13,547 (100.0)	43	2,700	16,290
8.4～ (%)	3,555 (90.4)	376 (9.6)	3,931 (100.0)	15	730	4,676
8.5～ (%)	40,311 (89.8)	4,602 (10.2)	44,913 (100.0)	152	8,837	53,902
9.0～ (%)	49,373 (90.2)	5,350 (9.8)	54,723 (100.0)	197	10,316	65,236
9.5～ (%)	31,938 (89.7)	3,662 (10.3)	35,600 (100.0)	88	6,716	42,404
10.0～ (%)	3,980 (90.0)	444 (10.0)	4,424 (100.0)	15	788	5,227
10.1～ (%)	9,987 (90.2)	1,080 (9.8)	11,067 (100.0)	35	2,175	13,277
10.5～ (%)	4,821 (89.8)	550 (10.2)	5,371 (100.0)	21	1,061	6,453
11.0～ (%)	1,622 (89.7)	186 (10.3)	1,808 (100.0)	7	350	2,165
11.5～ (%)	557 (87.4)	80 (12.6)	637 (100.0)	3	129	769
12.0～ (%)	399 (87.3)	58 (12.7)	457 (100.0)	3	79	539
合計 (%)	164,040 (90.0)	18,313 (10.0)	182,353 (100.0)	607	35,089	218,049
記載なし (%)	5,107 (89.2)	619 (10.8)	5,726 (100.0)	119	5,077	10,922
総計 (%)	169,147 (89.9)	18,932 (10.1)	188,079 (100.0)	726	40,166	228,971
平均	9.19	9.19	9.19	9.16	9.18	9.18
標準偏差	0.74	0.75	0.74	0.78	0.74	0.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査