

表 761 心筋梗塞の既往 PTH値(pg/mL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

| PTH値        | 既往なし              | 既往あり             | 合計                 | 不明     | 記載なし   | 総計      |
|-------------|-------------------|------------------|--------------------|--------|--------|---------|
| 20未満<br>(%) | 7,271<br>(90.7)   | 744<br>(9.3)     | 8,015<br>(100.0)   | 18     | 1,479  | 9,512   |
| 20～<br>(%)  | 10,477<br>(90.3)  | 1,126<br>(9.7)   | 11,603<br>(100.0)  | 29     | 2,097  | 13,729  |
| 40～<br>(%)  | 11,010<br>(90.1)  | 1,214<br>(9.9)   | 12,224<br>(100.0)  | 38     | 2,263  | 14,525  |
| 60～<br>(%)  | 11,840<br>(89.9)  | 1,330<br>(10.1)  | 13,170<br>(100.0)  | 39     | 2,305  | 15,514  |
| 80～<br>(%)  | 11,786<br>(89.3)  | 1,418<br>(10.7)  | 13,204<br>(100.0)  | 41     | 2,426  | 15,671  |
| 100～<br>(%) | 11,507<br>(89.8)  | 1,308<br>(10.2)  | 12,815<br>(100.0)  | 32     | 2,424  | 15,271  |
| 120～<br>(%) | 11,104<br>(90.3)  | 1,193<br>(9.7)   | 12,297<br>(100.0)  | 44     | 2,245  | 14,586  |
| 140～<br>(%) | 10,174<br>(90.1)  | 1,120<br>(9.9)   | 11,294<br>(100.0)  | 35     | 2,174  | 13,503  |
| 160～<br>(%) | 9,127<br>(90.0)   | 1,019<br>(10.0)  | 10,146<br>(100.0)  | 31     | 1,930  | 12,107  |
| 180～<br>(%) | 20,571<br>(89.7)  | 2,358<br>(10.3)  | 22,929<br>(100.0)  | 70     | 4,429  | 27,428  |
| 240～<br>(%) | 253<br>(90.7)     | 26<br>(9.3)      | 279<br>(100.0)     |        | 59     | 338     |
| 241～<br>(%) | 11,697<br>(89.5)  | 1,370<br>(10.5)  | 13,067<br>(100.0)  | 27     | 2,504  | 15,598  |
| 300～<br>(%) | 6,799<br>(90.2)   | 735<br>(9.8)     | 7,534<br>(100.0)   | 22     | 1,436  | 8,992   |
| 360～<br>(%) | 3,879<br>(90.0)   | 429<br>(10.0)    | 4,308<br>(100.0)   | 14     | 802    | 5,124   |
| 420～<br>(%) | 2,305<br>(90.9)   | 230<br>(9.1)     | 2,535<br>(100.0)   | 9      | 480    | 3,024   |
| 480～<br>(%) | 563<br>(91.4)     | 53<br>(8.6)      | 616<br>(100.0)     | 4      | 116    | 736     |
| 500～<br>(%) | 897<br>(90.4)     | 95<br>(9.6)      | 992<br>(100.0)     | 3      | 194    | 1,189   |
| 540～<br>(%) | 984<br>(90.6)     | 102<br>(9.4)     | 1,086<br>(100.0)   | 3      | 221    | 1,310   |
| 600～<br>(%) | 1,638<br>(91.6)   | 150<br>(8.4)     | 1,788<br>(100.0)   | 3      | 341    | 2,132   |
| 800～<br>(%) | 1,279<br>(91.9)   | 112<br>(8.1)     | 1,391<br>(100.0)   | 1      | 230    | 1,622   |
| 合計<br>(%)   | 145,161<br>(90.0) | 16,132<br>(10.0) | 161,293<br>(100.0) | 463    | 30,155 | 191,911 |
| 記載なし<br>(%) | 2,747<br>(88.6)   | 354<br>(11.4)    | 3,101<br>(100.0)   | 84     | 1,490  | 4,675   |
| 総計<br>(%)   | 147,908<br>(90.0) | 16,486<br>(10.0) | 164,394<br>(100.0) | 547    | 31,645 | 196,586 |
| 平均          | 170.18            | 166.24           | 169.79             | 162.95 | 171.04 | 169.97  |
| 標準偏差        | 162.83            | 143.45           | 161.00             | 125.17 | 161.28 | 160.97  |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査