

表 764 心筋梗塞の既往 総コレステロール濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

総コレステロール濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	4,616 (85.6)	774 (14.4)	5,390 (100.0)	30	1,034	6,454
100～ (%)	13,515 (86.9)	2,038 (13.1)	15,553 (100.0)	61	3,006	18,620
120～ (%)	25,314 (88.5)	3,287 (11.5)	28,601 (100.0)	107	5,607	34,315
140～ (%)	28,897 (89.7)	3,314 (10.3)	32,211 (100.0)	99	6,516	38,826
160～ (%)	24,036 (91.2)	2,310 (8.8)	26,346 (100.0)	70	5,167	31,583
180～ (%)	14,876 (91.6)	1,357 (8.4)	16,233 (100.0)	42	3,344	19,619
200～ (%)	7,753 (92.3)	649 (7.7)	8,402 (100.0)	24	1,783	10,209
220～ (%)	3,388 (92.5)	276 (7.5)	3,664 (100.0)	9	802	4,475
240～ (%)	1,332 (93.1)	99 (6.9)	1,431 (100.0)	1	301	1,733
260～ (%)	829 (92.0)	72 (8.0)	901 (100.0)	6	204	1,111
合計 (%)	124,556 (89.8)	14,176 (10.2)	138,732 (100.0)	449	27,764	166,945
記載なし (%)	44,591 (90.4)	4,756 (9.6)	49,347 (100.0)	277	12,402	62,026
総計 (%)	169,147 (89.9)	18,932 (10.1)	188,079 (100.0)	726	40,166	228,971
平均	155.26	148.36	154.55	148.90	155.61	154.71
標準偏差	35.19	34.36	35.17	36.93	35.80	35.28

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査