

表 765 心筋梗塞の既往 HDL-C濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	492	73	565	2	104	671
(%)	(87.1)	(12.9)	(100.0)			
20～	9,337	1,559	10,896	33	1,917	12,846
(%)	(85.7)	(14.3)	(100.0)			
30～	27,236	3,845	31,081	113	5,694	36,888
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			
40～	30,821	3,404	34,225	113	6,391	40,729
(%)	(90.1)	(9.9)	(100.0)			
50～	22,173	2,111	24,284	79	4,717	29,080
(%)	(91.3)	(8.7)	(100.0)			
60～	13,032	973	14,005	40	2,747	16,792
(%)	(93.1)	(6.9)	(100.0)			
70～	6,381	417	6,798	22	1,381	8,201
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
80～	2,974	190	3,164	10	660	3,834
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
90～	1,309	76	1,385	3	345	1,733
(%)	(94.5)	(5.5)	(100.0)			
100～	1,049	89	1,138	1	319	1,458
(%)	(92.2)	(7.8)	(100.0)			
合計	114,804	12,737	127,541	416	24,275	152,232
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
記載なし	54,343	6,195	60,538	310	15,891	76,739
(%)	(89.8)	(10.2)	(100.0)			
総計	169,147	18,932	188,079	726	40,166	228,971
(%)	(89.9)	(10.1)	(100.0)			
平均	48.49	44.42	48.09	46.77	49.16	48.25
標準偏差	16.45	15.31	16.39	14.75	17.32	16.54

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査