

表 766 心筋梗塞の既往 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

Non-HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	1,974 (87.9)	272 (12.1)	2,246 (100.0)	12	458	2,716
50～ (%)	9,405 (88.2)	1,257 (11.8)	10,662 (100.0)	51	2,193	12,906
70～ (%)	21,019 (88.8)	2,660 (11.2)	23,679 (100.0)	88	4,765	28,532
90～ (%)	25,009 (89.8)	2,844 (10.2)	27,853 (100.0)	104	5,622	33,579
110～ (%)	20,177 (90.5)	2,115 (9.5)	22,292 (100.0)	75	4,312	26,679
130～ (%)	12,239 (91.0)	1,206 (9.0)	13,445 (100.0)	35	2,653	16,133
150～ (%)	6,011 (90.4)	642 (9.6)	6,653 (100.0)	26	1,364	8,043
170～ (%)	2,715 (91.4)	255 (8.6)	2,970 (100.0)	7	590	3,567
190～ (%)	1,024 (91.2)	99 (8.8)	1,123 (100.0)	3	212	1,338
210～ (%)	598 (90.5)	63 (9.5)	661 (100.0)	4	167	832
合計 (%)	100,171 (89.8)	11,413 (10.2)	111,584 (100.0)	405	22,336	134,325
記載なし (%)	68,976 (90.2)	7,519 (9.8)	76,495 (100.0)	321	17,830	94,646
総計 (%)	169,147 (89.9)	18,932 (10.1)	188,079 (100.0)	726	40,166	228,971
平均	106.78	103.66	106.46	102.70	106.36	106.43
標準偏差	33.24	32.92	33.23	34.53	33.74	33.32

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査