

表 767 心筋梗塞の既往 透析前収縮期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前収縮 期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	24 (88.9)	3 (11.1)	27 (100.0)		8	35
60～ (%)	194 (84.0)	37 (16.0)	231 (100.0)		40	271
80～ (%)	1,688 (84.7)	304 (15.3)	1,992 (100.0)	11	374	2,377
100～ (%)	9,653 (87.6)	1,372 (12.4)	11,025 (100.0)	38	2,092	13,155
120～ (%)	31,236 (89.4)	3,691 (10.6)	34,927 (100.0)	124	6,525	41,576
140～ (%)	48,885 (90.3)	5,275 (9.7)	54,160 (100.0)	169	9,874	64,203
160～ (%)	35,561 (90.5)	3,744 (9.5)	39,305 (100.0)	122	7,416	46,843
180～ (%)	13,640 (90.2)	1,487 (9.8)	15,127 (100.0)	59	2,816	18,002
200～ (%)	3,495 (91.7)	317 (8.3)	3,812 (100.0)	12	691	4,515
220～ (%)	686 (91.5)	64 (8.5)	750 (100.0)	3	141	894
合計 (%)	145,062 (89.9)	16,294 (10.1)	161,356 (100.0)	538	29,977	191,871
記載なし (%)	24,085 (90.1)	2,638 (9.9)	26,723 (100.0)	188	10,189	37,100
総計 (%)	169,147 (89.9)	18,932 (10.1)	188,079 (100.0)	726	40,166	228,971
平均	151.86	149.74	151.65	151.20	151.63	151.64
標準偏差	23.91	24.69	24.00	25.51	24.09	24.02

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査