

表 768 心筋梗塞の既往 透析前拡張期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	45 (78.9)	12 (21.1)	57 (100.0)		10	67
20～ (%)	420 (83.2)	85 (16.8)	505 (100.0)	3	104	612
40～ (%)	11,812 (86.0)	1,925 (14.0)	13,737 (100.0)	54	2,566	16,357
60～ (%)	67,110 (89.0)	8,287 (11.0)	75,397 (100.0)	280	13,948	89,625
80～ (%)	35,864 (91.1)	3,519 (8.9)	39,383 (100.0)	113	7,344	46,840
90～ (%)	19,349 (92.2)	1,640 (7.8)	20,989 (100.0)	50	3,909	24,948
100～ (%)	9,460 (92.7)	749 (7.3)	10,209 (100.0)	34	1,899	12,142
120～ (%)	593 (95.2)	30 (4.8)	623 (100.0)	4	114	741
140～ (%)	47 (94.0)	3 (6.0)	50 (100.0)		7	57
合計 (%)	144,700 (89.9)	16,250 (10.1)	160,950 (100.0)	538	29,901	191,389
記載なし (%)	24,447 (90.1)	2,682 (9.9)	27,129 (100.0)	188	10,265	37,582
総計 (%)	169,147 (89.9)	18,932 (10.1)	188,079 (100.0)	726	40,166	228,971
平均	77.85	74.86	77.55	75.84	77.64	77.56
標準偏差	14.37	14.25	14.38	14.94	14.39	14.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査