

表 773 心筋梗塞の既往 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	11,342	987	12,329	24	2,723	15,076
(%)	(92.0)	(8.0)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	320	32	352		70	422
(%)	(90.9)	(9.1)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	215	14	229		55	284
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	268	12	280	1	78	359
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	152	8	160		35	195
(%)	(95.0)	(5.0)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	1,114	81	1,195	1	268	1,464
(%)	(93.2)	(6.8)	(100.0)			
腎硬化症	2,101	291	2,392	2	492	2,886
(%)	(87.8)	(12.2)	(100.0)			
悪性高血圧	221	31	252	1	59	312
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
糖尿病性腎症	9,170	1,663	10,833	26	2,314	13,173
(%)	(84.6)	(15.4)	(100.0)			
SLE腎炎	296	19	315		48	363
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
アミロイド腎	45	5	50		9	59
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
痛風腎	120	10	130	1	23	154
(%)	(92.3)	(7.7)	(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	32	1	33		11	44
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
腎・尿路結核	16	2	18		4	22
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
腎・尿路結石	49	10	59		10	69
(%)	(83.1)	(16.9)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	70	3	73		12	85
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
閉塞性尿路障害	54	9	63		11	74
(%)	(85.7)	(14.3)	(100.0)			
骨髄腫	15	2	17		2	19
(%)	(88.2)	(11.8)	(100.0)			
腎形成不全	83	3	86		15	101
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
不明	2,505	228	2,733	14	733	3,480
(%)	(91.7)	(8.3)	(100.0)			
再導入	325	26	351		65	416
(%)	(92.6)	(7.4)	(100.0)			
その他	647	53	700	2	187	889
(%)	(92.4)	(7.6)	(100.0)			
合計	29,160	3,490	32,650	72	7,224	39,946
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	29,160	3,490	32,650	72	7,224	39,946
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査