

表 783 心筋梗塞の既往 透析時間(時間/回)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析時間	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
3.0未満	76	6	82	1	9	92
(%)	(92.7)	(7.3)	(100.0)			
3.0～	1,619	196	1,815	6	461	2,282
(%)	(89.2)	(10.8)	(100.0)			
3.5～	1,850	206	2,056	2	421	2,479
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
4.0～	19,172	2,386	21,558	55	4,821	26,434
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
4.5～	2,947	332	3,279	3	566	3,848
(%)	(89.9)	(10.1)	(100.0)			
5.0～	3,012	326	3,338	2	692	4,032
(%)	(90.2)	(9.8)	(100.0)			
5.5～	182	14	196		22	218
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
6.0～	239	15	254	1	29	284
(%)	(94.1)	(5.9)	(100.0)			
6.5～	13	1	14	1	2	17
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
7.0～	27	5	32		4	36
(%)	(84.4)	(15.6)	(100.0)			
合計	29,137	3,487	32,624	71	7,027	39,722
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
記載なし	23	3	26	1	197	224
(%)	(88.5)	(11.5)	(100.0)			
総計	29,160	3,490	32,650	72	7,224	39,946
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
平均	4.11	4.08	4.10	4.00	4.08	4.10
標準偏差	0.51	0.49	0.51	0.59	0.48	0.50

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査