

表 784 心筋梗塞の既往 血流量(ml/分)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

血流量	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)					1	1
100～ (%)	28 (82.4)	6 (17.6)	34 (100.0)		3	37
120～ (%)	69 (83.1)	14 (16.9)	83 (100.0)		11	94
140～ (%)	934 (84.0)	178 (16.0)	1,112 (100.0)	4	226	1,342
160～ (%)	393 (84.5)	72 (15.5)	465 (100.0)	1	112	578
180～ (%)	2,005 (85.6)	337 (14.4)	2,342 (100.0)	4	600	2,946
200～ (%)	9,869 (88.2)	1,326 (11.8)	11,195 (100.0)	20	2,332	13,547
220～ (%)	4,946 (90.4)	528 (9.6)	5,474 (100.0)	10	1,123	6,607
240～ (%)	6,879 (90.9)	689 (9.1)	7,568 (100.0)	7	1,552	9,127
260～ (%)	840 (92.0)	73 (8.0)	913 (100.0)	2	163	1,078
280～ (%)	776 (91.9)	68 (8.1)	844 (100.0)		176	1,020
300～ (%)	1,969 (93.3)	141 (6.7)	2,110 (100.0)	11	344	2,465
350～ (%)	268 (92.7)	21 (7.3)	289 (100.0)		56	345
400～ (%)	141 (90.4)	15 (9.6)	156 (100.0)		46	202
合計 (%)	29,117 (89.4)	3,468 (10.6)	32,585 (100.0)	59	6,745	39,389
記載なし (%)	43 (66.2)	22 (33.8)	65 (100.0)	13	479	557
総計 (%)	29,160 (89.3)	3,490 (10.7)	32,650 (100.0)	72	7,224	39,946
平均	225.40	216.76	224.48	225.76	222.70	224.18
標準偏差	40.45	39.20	40.40	46.06	40.04	40.35

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査