

表 787 心筋梗塞の既往 体重減少量(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満 (%)	82 (93.2)	6 (6.8)	88 (100.0)		9	97
0.0～ (%)	974 (88.4)	128 (11.6)	1,102 (100.0)	4	214	1,320
1.0～ (%)	5,497 (89.1)	670 (10.9)	6,167 (100.0)	17	1,216	7,400
2.0～ (%)	10,780 (88.8)	1,361 (11.2)	12,141 (100.0)	20	2,493	14,654
3.0～ (%)	5,955 (89.2)	722 (10.8)	6,677 (100.0)	9	1,328	8,014
4.0～ (%)	1,639 (89.7)	189 (10.3)	1,828 (100.0)	1	362	2,191
5.0～ (%)	300 (91.5)	28 (8.5)	328 (100.0)		72	400
6.0～ (%)	44 (93.6)	3 (6.4)	47 (100.0)		12	59
7.0～ (%)	14 (100.0)		14 (100.0)		2	16
8.0～ (%)	26 (92.9)	2 (7.1)	28 (100.0)		2	30
合計 (%)	25,311 (89.1)	3,109 (10.9)	28,420 (100.0)	51	5,710	34,181
記載なし (%)	132 (81.5)	30 (18.5)	162 (100.0)	10	618	790
総計 (%)	25,443 (89.0)	3,139 (11.0)	28,582 (100.0)	61	6,328	34,971
平均	2.57	2.54	2.57	2.18	2.57	2.57
標準偏差	1.04	1.01	1.04	0.83	1.01	1.03

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査