

表 788 心筋梗塞の既往 体重減少率(%)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	449 (88.9)	56 (11.1)	505 (100.0)	1	81	587
1.0～ (%)	791 (87.7)	111 (12.3)	902 (100.0)	3	186	1,091
2.0～ (%)	2,249 (88.9)	280 (11.1)	2,529 (100.0)	4	497	3,030
3.0～ (%)	5,107 (88.7)	651 (11.3)	5,758 (100.0)	8	1,127	6,893
4.0～ (%)	6,901 (88.5)	893 (11.5)	7,794 (100.0)	21	1,562	9,377
5.0～ (%)	5,487 (89.6)	635 (10.4)	6,122 (100.0)	9	1,293	7,424
6.0～ (%)	2,748 (89.3)	329 (10.7)	3,077 (100.0)	5	643	3,725
7.0～ (%)	1,067 (90.9)	107 (9.1)	1,174 (100.0)		234	1,408
8.0～ (%)	349 (91.4)	33 (8.6)	382 (100.0)		54	436
9.0～ (%)	146 (91.8)	13 (8.2)	159 (100.0)		31	190
合計 (%)	25,294 (89.1)	3,108 (10.9)	28,402 (100.0)	51	5,708	34,161
記載なし (%)	149 (82.8)	31 (17.2)	180 (100.0)	10	620	810
総計 (%)	25,443 (89.0)	3,139 (11.0)	28,582 (100.0)	61	6,328	34,971
平均	4.60	4.51	4.59	4.30	4.61	4.59
標準偏差	1.60	1.55	1.59	1.44	1.54	1.59

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査