

表 789 心筋梗塞の既往 Body Mass Index別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

Body Mass Index	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
14未満	117	11	128		21	149
(%)	(91.4)	(8.6)	(100.0)			
14～	755	97	852	2	192	1,046
(%)	(88.6)	(11.4)	(100.0)			
16～	3,046	351	3,397	9	592	3,998
(%)	(89.7)	(10.3)	(100.0)			
18～	5,796	704	6,500	8	1,106	7,614
(%)	(89.2)	(10.8)	(100.0)			
20～	6,394	776	7,170	7	1,285	8,462
(%)	(89.2)	(10.8)	(100.0)			
22～	4,966	606	5,572	9	990	6,571
(%)	(89.1)	(10.9)	(100.0)			
24～	3,110	386	3,496	8	584	4,088
(%)	(89.0)	(11.0)	(100.0)			
26～	1,684	201	1,885	3	309	2,197
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
28～	896	112	1,008	1	168	1,177
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
30～	814	74	888	2	127	1,017
(%)	(91.7)	(8.3)	(100.0)			
合計	27,578	3,318	30,896	49	5,374	36,319
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
記載なし	1,582	172	1,754	23	1,850	3,627
(%)	(90.2)	(9.8)	(100.0)			
総計	29,160	3,490	32,650	72	7,224	39,946
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
平均	21.69	21.65	21.69	21.56	21.55	21.67
標準偏差	3.67	3.57	3.65	3.92	3.59	3.65

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査