

表 791 心筋梗塞の既往 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前クレアチニン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	3 (100.0)		3 (100.0)			3
2～ (%)	99 (81.8)	22 (18.2)	121 (100.0)		26	147
4～ (%)	623 (81.4)	142 (18.6)	765 (100.0)	3	150	918
6～ (%)	2,634 (84.9)	468 (15.1)	3,102 (100.0)	8	640	3,750
8～ (%)	6,390 (86.9)	961 (13.1)	7,351 (100.0)	20	1,376	8,747
10～ (%)	7,622 (90.2)	829 (9.8)	8,451 (100.0)	13	1,683	10,147
12～ (%)	4,997 (91.0)	492 (9.0)	5,489 (100.0)	6	1,143	6,638
14～ (%)	2,155 (93.3)	155 (6.7)	2,310 (100.0)	1	509	2,820
16～ (%)	804 (95.3)	40 (4.7)	844 (100.0)	1	203	1,048
合計 (%)	25,327 (89.1)	3,109 (10.9)	28,436 (100.0)	52	5,730	34,218
記載なし (%)	116 (79.5)	30 (20.5)	146 (100.0)	9	598	753
総計 (%)	25,443 (89.0)	3,139 (11.0)	28,582 (100.0)	61	6,328	34,971
平均	10.79	10.02	10.70	9.66	10.80	10.72
標準偏差	2.64	2.58	2.65	2.44	2.71	2.66

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査