

表 793 心筋梗塞の既往 equilibrated Kt/V(eKt/V) 別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	14 (93.3)	1 (6.7)	15 (100.0)		5	20
0.4～ (%)	29 (82.9)	6 (17.1)	35 (100.0)	1	8	44
0.6～ (%)	237 (83.5)	47 (16.5)	284 (100.0)		52	336
0.8～ (%)	1,569 (86.0)	255 (14.0)	1,824 (100.0)	1	386	2,211
1.0～ (%)	5,452 (87.3)	796 (12.7)	6,248 (100.0)	9	1,245	7,502
1.2～ (%)	7,501 (88.1)	1,018 (11.9)	8,519 (100.0)	17	1,603	10,139
1.4～ (%)	5,420 (90.5)	572 (9.5)	5,992 (100.0)	13	1,125	7,130
1.6～ (%)	2,641 (92.8)	205 (7.2)	2,846 (100.0)	4	522	3,372
1.8～ (%)	1,007 (93.3)	72 (6.7)	1,079 (100.0)	3	210	1,292
2.0～ (%)	691 (93.5)	48 (6.5)	739 (100.0)	2	149	890
合計 (%)	24,561 (89.1)	3,020 (10.9)	27,581 (100.0)	50	5,305	32,936
記載なし (%)	882 (88.1)	119 (11.9)	1,001 (100.0)	11	1,023	2,035
総計 (%)	25,443 (89.0)	3,139 (11.0)	28,582 (100.0)	61	6,328	34,971
平均	1.36	1.29	1.35	1.40	1.34	1.35
標準偏差	0.29	0.27	0.29	0.32	0.29	0.29

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査