

表 794 心筋梗塞の既往 nPCR(g/kg/day)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

nPCR	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満	32	4	36		7	43
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
0.4～	796	157	953	2	175	1,130
(%)	(83.5)	(16.5)	(100.0)			
0.6～	6,632	1,001	7,633	13	1,427	9,073
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
0.8～	11,163	1,302	12,465	20	2,395	14,880
(%)	(89.6)	(10.4)	(100.0)			
1.0～	4,954	476	5,430	11	1,090	6,531
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
1.2～	895	74	969	4	194	1,167
(%)	(92.4)	(7.6)	(100.0)			
1.4～	105	7	112		16	128
(%)	(93.8)	(6.3)	(100.0)			
1.6～	10		10		3	13
(%)	(100.0)		(100.0)			
1.8～	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
2.0～	5		5		1	6
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	24,593	3,021	27,614	50	5,308	32,972
(%)	(89.1)	(10.9)	(100.0)			
記載なし	850	118	968	11	1,020	1,999
(%)	(87.8)	(12.2)	(100.0)			
総計	25,443	3,139	28,582	61	6,328	34,971
(%)	(89.0)	(11.0)	(100.0)			
平均	0.89	0.85	0.88	0.90	0.88	0.88
標準偏差	0.17	0.17	0.17	0.19	0.17	0.17

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査