

表 795 心筋梗塞の既往 %クレアチニン産生速度(%)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

%クレアチニン 産生速度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	1,150 (83.6)	225 (16.4)	1,375 (100.0)	4	255	1,634
60～ (%)	998 (84.3)	186 (15.7)	1,184 (100.0)	5	215	1,404
70～ (%)	1,784 (84.9)	318 (15.1)	2,102 (100.0)	2	374	2,478
80～ (%)	2,812 (85.5)	478 (14.5)	3,290 (100.0)	5	573	3,868
90～ (%)	3,734 (87.3)	541 (12.7)	4,275 (100.0)	15	810	5,100
100～ (%)	4,431 (90.5)	466 (9.5)	4,897 (100.0)	4	933	5,834
110～ (%)	4,160 (91.6)	382 (8.4)	4,542 (100.0)	7	850	5,399
120～ (%)	2,947 (92.4)	241 (7.6)	3,188 (100.0)	4	651	3,843
130～ (%)	1,577 (92.9)	120 (7.1)	1,697 (100.0)	2	393	2,092
140～ (%)	990 (94.0)	63 (6.0)	1,053 (100.0)	2	253	1,308
合計 (%)	24,583 (89.1)	3,020 (10.9)	27,603 (100.0)	50	5,307	32,960
記載なし (%)	860 (87.8)	119 (12.2)	979 (100.0)	11	1,021	2,011
総計 (%)	25,443 (89.0)	3,139 (11.0)	28,582 (100.0)	61	6,328	34,971
平均	102.50	95.01	101.68	96.15	103.25	101.92
標準偏差	23.55	23.86	23.70	26.54	24.72	23.87

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査