

表 796 心筋梗塞の既往 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前アルブミン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	7 (70.0)	3 (30.0)	10 (100.0)			10
1.5～ (%)	44 (81.5)	10 (18.5)	54 (100.0)		8	62
2.0～ (%)	208 (82.9)	43 (17.1)	251 (100.0)	2	41	294
2.5～ (%)	1,000 (85.8)	166 (14.2)	1,166 (100.0)	6	220	1,392
3.0～ (%)	6,419 (87.3)	938 (12.7)	7,357 (100.0)	14	1,436	8,807
3.5～ (%)	15,447 (89.9)	1,741 (10.1)	17,188 (100.0)	26	3,371	20,585
4.0～ (%)	5,424 (91.4)	510 (8.6)	5,934 (100.0)	9	1,215	7,158
4.5～ (%)	253 (94.1)	16 (5.9)	269 (100.0)	1	47	317
5.0～ (%)	14 (87.5)	2 (12.5)	16 (100.0)		2	18
合計 (%)	28,816 (89.4)	3,429 (10.6)	32,245 (100.0)	58	6,340	38,643
記載なし (%)	344 (84.9)	61 (15.1)	405 (100.0)	14	884	1,303
総計 (%)	29,160 (89.3)	3,490 (10.7)	32,650 (100.0)	72	7,224	39,946
平均	3.64	3.57	3.63	3.53	3.65	3.64
標準偏差	0.39	0.41	0.39	0.49	0.38	0.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査