

表 797 心筋梗塞の既往 透析前CRP濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前CRP濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	15,849 (91.1)	1,544 (8.9)	17,393 (100.0)	30	3,281	20,704
0.2～ (%)	4,770 (87.1)	709 (12.9)	5,479 (100.0)	7	991	6,477
0.5～ (%)	2,265 (85.7)	378 (14.3)	2,643 (100.0)	4	526	3,173
1.0～ (%)	1,421 (85.8)	235 (14.2)	1,656 (100.0)	3	344	2,003
2.0～ (%)	827 (85.6)	139 (14.4)	966 (100.0)		168	1,134
4.0～ (%)	288 (85.0)	51 (15.0)	339 (100.0)		68	407
6.0～ (%)	121 (84.6)	22 (15.4)	143 (100.0)	1	27	171
8.0～ (%)	58 (81.7)	13 (18.3)	71 (100.0)		23	94
10.0～ (%)	75 (79.8)	19 (20.2)	94 (100.0)		14	108
15.0～ (%)	57 (82.6)	12 (17.4)	69 (100.0)	2	13	84
合計 (%)	25,731 (89.2)	3,122 (10.8)	28,853 (100.0)	47	5,455	34,355
記載なし (%)	3,429 (90.3)	368 (9.7)	3,797 (100.0)	25	1,769	5,591
総計 (%)	29,160 (89.3)	3,490 (10.7)	32,650 (100.0)	72	7,224	39,946
平均	0.53	0.76	0.55	1.25	0.55	0.55
標準偏差	1.73	2.14	1.78	4.17	1.59	1.76

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査