

表 798 心筋梗塞の既往 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前補正 カルシウム濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	121 (86.4)	19 (13.6)	140 (100.0)		20	160
7.0～ (%)	206 (92.0)	18 (8.0)	224 (100.0)		35	259
7.5～ (%)	712 (90.5)	75 (9.5)	787 (100.0)	1	163	951
8.0～ (%)	2,164 (90.1)	237 (9.9)	2,401 (100.0)	5	462	2,868
8.4～ (%)	620 (88.4)	81 (11.6)	701 (100.0)	2	115	818
8.5～ (%)	6,979 (89.7)	802 (10.3)	7,781 (100.0)	11	1,509	9,301
9.0～ (%)	8,619 (89.5)	1,014 (10.5)	9,633 (100.0)	16	1,866	11,515
9.5～ (%)	5,626 (89.3)	677 (10.7)	6,303 (100.0)	12	1,297	7,612
10.0～ (%)	653 (88.5)	85 (11.5)	738 (100.0)		165	903
10.1～ (%)	1,802 (88.2)	241 (11.8)	2,043 (100.0)	6	403	2,452
10.5～ (%)	845 (87.6)	120 (12.4)	965 (100.0)	1	204	1,170
11.0～ (%)	290 (90.6)	30 (9.4)	320 (100.0)	2	61	383
11.5～ (%)	100 (89.3)	12 (10.7)	112 (100.0)	1	19	132
12.0～ (%)	52 (81.3)	12 (18.8)	64 (100.0)		7	71
合計 (%)	28,789 (89.4)	3,423 (10.6)	32,212 (100.0)	57	6,326	38,595
記載なし (%)	371 (84.7)	67 (15.3)	438 (100.0)	15	898	1,351
総計 (%)	29,160 (89.3)	3,490 (10.7)	32,650 (100.0)	72	7,224	39,946
平均	9.18	9.21	9.18	9.34	9.20	9.19
標準偏差	0.75	0.77	0.75	0.80	0.73	0.75

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査