

表 799 心筋梗塞の既往 透析前リン濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前リン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	823 (85.1)	144 (14.9)	967 (100.0)	1	165	1,133
3.0～ (%)	1,157 (87.3)	169 (12.7)	1,326 (100.0)	3	245	1,574
3.5～ (%)	2,099 (88.3)	277 (11.7)	2,376 (100.0)	7	466	2,849
4.0～ (%)	3,398 (89.2)	411 (10.8)	3,809 (100.0)	9	747	4,565
4.5～ (%)	4,219 (88.7)	539 (11.3)	4,758 (100.0)	9	945	5,712
5.0～ (%)	4,588 (89.8)	520 (10.2)	5,108 (100.0)	8	1,018	6,134
5.5～ (%)	3,988 (90.4)	424 (9.6)	4,412 (100.0)	5	882	5,299
6.0～ (%)	720 (91.0)	71 (9.0)	791 (100.0)	1	158	950
6.1～ (%)	2,404 (89.4)	286 (10.6)	2,690 (100.0)	2	552	3,244
6.5～ (%)	2,086 (89.7)	239 (10.3)	2,325 (100.0)	4	477	2,806
7.0～ (%)	1,356 (90.7)	139 (9.3)	1,495 (100.0)	4	276	1,775
7.5～ (%)	827 (90.6)	86 (9.4)	913 (100.0)	1	190	1,104
8.0～ (%)	496 (90.3)	53 (9.7)	549 (100.0)	1	101	651
8.5～ (%)	318 (88.1)	43 (11.9)	361 (100.0)		62	423
9.0～ (%)	522 (91.7)	47 (8.3)	569 (100.0)	1	112	682
合計 (%)	29,001 (89.4)	3,448 (10.6)	32,449 (100.0)	56	6,396	38,901
記載なし (%)	159 (79.1)	42 (20.9)	201 (100.0)	16	828	1,045
総計 (%)	29,160 (89.3)	3,490 (10.7)	32,650 (100.0)	72	7,224	39,946
平均	5.37	5.24	5.35	5.16	5.37	5.36
標準偏差	1.43	1.44	1.43	1.37	1.40	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査