

表 800 心筋梗塞の既往 PTH値(pg/mL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	1,305 (91.1)	128 (8.9)	1,433 (100.0)	5	245	1,683
20～ (%)	1,591 (87.9)	219 (12.1)	1,810 (100.0)	6	379	2,195
40～ (%)	1,807 (89.3)	217 (10.7)	2,024 (100.0)	5	408	2,437
60～ (%)	1,925 (89.1)	235 (10.9)	2,160 (100.0)	7	425	2,592
80～ (%)	2,119 (88.9)	265 (11.1)	2,384 (100.0)	6	456	2,846
100～ (%)	2,059 (88.7)	263 (11.3)	2,322 (100.0)	2	471	2,795
120～ (%)	1,874 (87.8)	260 (12.2)	2,134 (100.0)	3	444	2,581
140～ (%)	1,755 (90.3)	188 (9.7)	1,943 (100.0)	5	375	2,323
160～ (%)	1,572 (88.1)	212 (11.9)	1,784 (100.0)	4	362	2,150
180～ (%)	3,742 (89.8)	426 (10.2)	4,168 (100.0)	4	833	5,005
240～ (%)	66 (95.7)	3 (4.3)	69 (100.0)		8	77
241～ (%)	2,222 (89.1)	271 (10.9)	2,493 (100.0)	3	459	2,955
300～ (%)	1,279 (89.6)	149 (10.4)	1,428 (100.0)	2	284	1,714
360～ (%)	768 (89.5)	90 (10.5)	858 (100.0)	1	183	1,042
420～ (%)	432 (90.6)	45 (9.4)	477 (100.0)		114	591
480～ (%)	118 (93.7)	8 (6.3)	126 (100.0)		20	146
500～ (%)	167 (91.3)	16 (8.7)	183 (100.0)		54	237
540～ (%)	191 (91.4)	18 (8.6)	209 (100.0)	1	42	252
600～ (%)	324 (89.5)	38 (10.5)	362 (100.0)		61	423
800～ (%)	269 (89.4)	32 (10.6)	301 (100.0)	1	48	350
合計 (%)	25,585 (89.2)	3,083 (10.8)	28,668 (100.0)	55	5,671	34,394
記載なし (%)	448 (91.1)	44 (8.9)	492 (100.0)	7	235	734
総計 (%)	26,033 (89.3)	3,127 (10.7)	29,160 (100.0)	62	5,906	35,128
平均	178.11	173.22	177.59	137.75	175.97	177.26
標準偏差	173.12	158.98	171.66	140.46	158.07	169.45

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査