

表 802 心筋梗塞の既往 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前ヘモグロビン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
5未満	22	2	24		2	26
(%)	(91.7)	(8.3)	(100.0)			
5～	27		27	1	3	31
(%)	(100.0)		(100.0)			
6～	86	14	100		14	114
(%)	(86.0)	(14.0)	(100.0)			
7～	327	55	382		63	445
(%)	(85.6)	(14.4)	(100.0)			
8～	1,182	199	1,381	5	251	1,637
(%)	(85.6)	(14.4)	(100.0)			
9～	4,327	520	4,847	11	992	5,850
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
10～	9,623	1,100	10,723	22	2,202	12,947
(%)	(89.7)	(10.3)	(100.0)			
11～	8,682	954	9,636	10	1,931	11,577
(%)	(90.1)	(9.9)	(100.0)			
12～	3,276	406	3,682	6	694	4,382
(%)	(89.0)	(11.0)	(100.0)			
13～	876	120	996	1	188	1,185
(%)	(88.0)	(12.0)	(100.0)			
14～	397	63	460		63	523
(%)	(86.3)	(13.7)	(100.0)			
合計	28,825	3,433	32,258	56	6,403	38,717
(%)	(89.4)	(10.6)	(100.0)			
記載なし	335	57	392	16	821	1,229
(%)	(85.5)	(14.5)	(100.0)			
総計	29,160	3,490	32,650	72	7,224	39,946
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
平均	10.84	10.82	10.84	10.46	10.83	10.84
標準偏差	1.27	1.35	1.28	1.33	1.19	1.26

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査