

表 803 心筋梗塞の既往 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

総コレステロール濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	726 (86.6)	112 (13.4)	838 (100.0)	4	150	992
100～ (%)	2,076 (85.0)	365 (15.0)	2,441 (100.0)	10	537	2,988
120～ (%)	4,135 (87.4)	595 (12.6)	4,730 (100.0)	8	956	5,694
140～ (%)	5,095 (88.5)	659 (11.5)	5,754 (100.0)	5	1,146	6,905
160～ (%)	4,517 (90.7)	464 (9.3)	4,981 (100.0)	12	1,018	6,011
180～ (%)	2,957 (92.1)	255 (7.9)	3,212 (100.0)	5	656	3,873
200～ (%)	1,713 (92.7)	134 (7.3)	1,847 (100.0)	8	398	2,253
220～ (%)	730 (94.2)	45 (5.8)	775 (100.0)		181	956
240～ (%)	284 (90.7)	29 (9.3)	313 (100.0)		71	384
260～ (%)	150 (90.9)	15 (9.1)	165 (100.0)	1	50	216
合計 (%)	22,383 (89.3)	2,673 (10.7)	25,056 (100.0)	53	5,163	30,272
記載なし (%)	6,777 (89.2)	817 (10.8)	7,594 (100.0)	19	2,061	9,674
総計 (%)	29,160 (89.3)	3,490 (10.7)	32,650 (100.0)	72	7,224	39,946
平均	158.74	150.20	157.83	153.79	158.88	158.00
標準偏差	35.56	34.14	35.51	41.98	36.53	35.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査