

表 804 心筋梗塞の既往 HDL-C濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	52	15	67		14	81
(%)	(77.6)	(22.4)	(100.0)			
20～	1,309	247	1,556	1	317	1,874
(%)	(84.1)	(15.9)	(100.0)			
30～	4,421	724	5,145	8	978	6,131
(%)	(85.9)	(14.1)	(100.0)			
40～	5,431	673	6,104	5	1,251	7,360
(%)	(89.0)	(11.0)	(100.0)			
50～	4,489	445	4,934	8	1,029	5,971
(%)	(91.0)	(9.0)	(100.0)			
60～	3,004	230	3,234	5	618	3,857
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
70～	1,551	107	1,658	4	361	2,023
(%)	(93.5)	(6.5)	(100.0)			
80～	788	52	840	2	171	1,013
(%)	(93.8)	(6.2)	(100.0)			
90～	344	13	357	2	72	431
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
100～	297	16	313		70	383
(%)	(94.9)	(5.1)	(100.0)			
合計	21,686	2,522	24,208	35	4,881	29,124
(%)	(89.6)	(10.4)	(100.0)			
記載なし	7,474	968	8,442	37	2,343	10,822
(%)	(88.5)	(11.5)	(100.0)			
総計	29,160	3,490	32,650	72	7,224	39,946
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
平均	51.35	45.89	50.79	56.09	51.16	50.85
標準偏差	17.25	15.46	17.15	18.82	17.33	17.18

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査