

表 805 心筋梗塞の既往 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

Non-HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	383 (89.1)	47 (10.9)	430 (100.0)	3	96	529
50～ (%)	1,742 (88.3)	230 (11.7)	1,972 (100.0)	5	426	2,403
70～ (%)	3,752 (88.4)	492 (11.6)	4,244 (100.0)	11	883	5,138
90～ (%)	4,572 (88.2)	611 (11.8)	5,183 (100.0)	7	1,075	6,265
110～ (%)	3,815 (90.2)	416 (9.8)	4,231 (100.0)	3	928	5,162
130～ (%)	2,351 (90.7)	240 (9.3)	2,591 (100.0)	1	557	3,149
150～ (%)	1,204 (92.9)	92 (7.1)	1,296 (100.0)	1	300	1,597
170～ (%)	509 (90.7)	52 (9.3)	561 (100.0)	2	119	682
190～ (%)	183 (88.4)	24 (11.6)	207 (100.0)		55	262
210～ (%)	98 (89.9)	11 (10.1)	109 (100.0)		32	141
合計 (%)	18,609 (89.4)	2,215 (10.6)	20,824 (100.0)	33	4,471	25,328
記載なし (%)	10,551 (89.2)	1,275 (10.8)	11,826 (100.0)	39	2,753	14,618
総計 (%)	29,160 (89.3)	3,490 (10.7)	32,650 (100.0)	72	7,224	39,946
平均	107.35	103.94	106.98	90.42	107.87	107.12
標準偏差	33.34	32.14	33.23	35.30	33.97	33.37

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査