

表 806 心筋梗塞の既往 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前収縮 期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	2 (100.0)		2 (100.0)			2
60～ (%)	81 (82.7)	17 (17.3)	98 (100.0)		17	115
80～ (%)	447 (83.9)	86 (16.1)	533 (100.0)	2	80	615
100～ (%)	2,050 (86.6)	316 (13.4)	2,366 (100.0)	3	431	2,800
120～ (%)	5,618 (88.5)	727 (11.5)	6,345 (100.0)	12	1,282	7,639
140～ (%)	8,595 (90.0)	954 (10.0)	9,549 (100.0)	20	1,864	11,433
160～ (%)	6,221 (90.7)	640 (9.3)	6,861 (100.0)	17	1,430	8,308
180～ (%)	2,360 (90.4)	250 (9.6)	2,610 (100.0)	1	543	3,154
200～ (%)	617 (90.9)	62 (9.1)	679 (100.0)	2	141	822
220～ (%)	162 (88.5)	21 (11.5)	183 (100.0)		33	216
合計 (%)	26,153 (89.5)	3,073 (10.5)	29,226 (100.0)	57	5,821	35,104
記載なし (%)	3,007 (87.8)	417 (12.2)	3,424 (100.0)	15	1,403	4,842
総計 (%)	29,160 (89.3)	3,490 (10.7)	32,650 (100.0)	72	7,224	39,946
平均	150.86	147.48	150.51	149.72	151.48	150.67
標準偏差	24.95	26.21	25.11	23.28	24.72	25.04

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査